

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



CONDUITE A TENIR DEVANT UNE BRÛLURE CAUSTIQUE DE L'OESOPHAGE

*DOCTEURS/ FENNICHE N
AMRANI I*

INTRODUCTION

- ***Lésions oesophagiennes liées à l'ingestion d'un produit chimique capable de détruire par contact la structure des tissus organiques.***
- ***Urgence + + +***
- ***PEC multidisciplinaire***
- ***Le bilan initial endoscopique → l'inventaire des lésions digestives et respiratoires qui conditionnent le PC et commandent la stratégie thérapeutique***

ÉPIDÉMIOLOGIE

1) TERRAIN:

Adulte

Plus souvent volontaire +++ (but suicidaire)

Rarement accidentelle favorisée / intoxication alcoolique aigue

Enfant : *+++ accidentelle / négligence des parents*

2) PRODUITS EN CAUSE : 03 types

- ✓ *Acides forts → nécrose de coagulation*
- ✓ *Bases fortes → nécrose de liquéfaction*
- ✓ *Oxydants → brûlures thermiques par dégagement de la chaleur*

En ALgérie : **Eau de Javel * Acide de Batterie * Olivette *Esprit de sel*

CONDUITE A TENIR PROPREMENT DITE

1) Avant l'hospitalisation:

- ✓ *À domicile et pendant le transport*

2) À l'hôpital :

- ✓ *Évaluer la gravité (éliminer une complication)*
- ✓ *Bilan endoscopique*
- ✓ *Prise en charge thérapeutique en fonction de l'endoscopie*

AVANT HOSPITALISATION

➤ *Certains gestes sont à proscrire afin de ne pas aggraver les lésions*

déjà constituées:

- *Faire vomir le patient*
- *Sonde gastrique*
- *Administration des produits par voie orale*

IL N'EXISTE PAS D'ANTIDOTE

- *Diriger le patient vers un centre H disposant d'une équipe multidisciplinaire(anesthésiste, Réa, chirurgien, endoscopiste)*

A L'HOPITAL

ETAPE CLINIQUE:

Interrogatoire : produit(nature, [], V3,heure) /mdct/ terrain

examen clinique complet → rechercher une complication immédiate

État hémodynamique, respiratoire, neurologique, perforation ,ORL

BILAN PARA CLINIQUE:

Biologique

Groupage sanguin, FNS+ bilan CIVD, Urée, Creat, Gazométrie

Ionogramme Sanguin et urinaire

Radiologique:

TLT : {
* Pneumomédiastin
* Pneumopéritoine
* Épanchement pleural

ASP: * Pneumopéritoine

Au terme de ce bilan: 02 situations se présentent

Forme compliquée

- ❖ ***Détresse respiratoire***
- ❖ ***Perforation***
- ❖ ***Hémorragie massive***
- ❖ ***Troubles neuropsychiques***

Forme non compliquée

- ❖ ***Bilan endoscopique***

formes compliquées

▪ *Détresse respiratoire*

- *Éviter le décubitus dorsal*
- *Désobstruction oropharyngée*
- *Oxygénation/ voie nasale*
- *Mep 1 ou O2 voies d'abord veineuses périphériques ou une voie centrale*
- *CTC à forte dose: œdème laryngé*
- *Intubation difficile*
- *Trachéotomie*

▪ *Chirurgie en urgence*

- *État de choc hypovolémique persistant malgré la Réa*
- *signes cliniques ou radiologiques de perforation oesogastrique*
- *Troubles neuropsychiques en absence de prise d'alcool et de psychotropes*
- *CIVD*
- *Acidose métabolique*
- *Insuffisance rénale aigue*

Formes non compliquées

Bilan endoscopique

➤ La FOGD : Principal examen morphologique initial

1-Intérêt: Dc – TRT et Pc

2- conditions:

- ✓ Patient stable
- ✓ précoce 6-24h/ CI après 48h
- ✓ Examen sous contrôle de la vue + prudence
- ✓ Faible insufflation / aspiration maximale
- ✓ Retrovision proscrite
- ✓ examen doit être complet

3- résultats : classification endoscopique

➤ ENDOSCOPIE BRONCHIQUE :

★ *Systématique en cas de lésions sévères des 2/3 > de l'œsophage en raison du risque de mediastinite par diffusion transoesophagienne du caustique, de régurgitation et d'inhalation massive*


✧ *Elle est indispensable au choix d'une stratégie chirurgicale*

Stade 0



normal

Stade I



Érythème/pétéchies

Stade IIa



*Ulcérations linéaires
ou arrondies*


CLASSIFICATION ENDOSCOPIQUE

Stade IIb




*Ulcérations Circulaires/
confluentes*

stade III a



*Nécrose
localisée*

Stade IIIb



*Nécrose
diffuse*

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

■ *Stade 0,I: alimentation orale immédiate*


■ *Stade III B: endoscopie bronchique*

Lésions sévères : nécrose

plastie tracheo bronchique:
Début/ une thoracotomie exploratrice
segment dorsal du lobe > droit.
suturé aux anneaux trachéaux et à la membraneuse saine afin que le parenchyme pulmonaire recouvre parfaitement la lésion sans fuite aérienne

Pas de lésions sévères

stripping oesophagien:
oesophagectomie totale à thorax fermé par double voie d'abord cervicale et abdominale +
Jejunostomie et œsophagostomie cervicale.



Stratégie thérapeutique : autres stades

- *Réa intensive hydroelectrolytique*
- *Mise au repos du tractus digestif jusqu'à cicatrisation*
- *des lésions:*
 - ♣ *Hyperalimentation parentérale totale ou entérale par jéjunostomie en cas de lésions sévères.*
- *Antibiotiques.*
- *Antalgiques: éviter les morphiniques (peuvent masquer un sd péritonéal).*
- *Corticoïdes: controversés.*
- *Surveillance des complications II aires+++*

STRATÉGIE NUTRITIONNELLE

II A : NPT pendant une semaine

contrôle endoscopiques à J8

améliorations des lésions

alimentation peros

absence d'amélioration

NPT 21 J

II B III A: NPT pendant 03 semaines

FOGD J21

Amélioration

Alimentation peros

Persistance de lésions

***Jejunostomie ou
dilatation précoce 4^{ème}
ou 5^{ème} S***

ÉVOLUTION

- *Favorable pour stade 0, I, II a*
- *Emmaillée de complications pour les autres stades:*

Précoces:

- ★ *Infectieuse*
- ★ *Perforation*
- ★ *Hémorragie*
- ★ *Fistules*

Tardives:

- ★ *Sténose*
- ★ *Dégénérescence: Kc oeso*



*Après 20 à 40ans
d'évolution*

(traumatisme iatrogène)



Surveillance endoscopique régulière après 20 an



BILAN DÉFINITIF: *fin du 3^{ème} mois*

- *Examen ORL => rechercher une sténose associée pharyngée ou pharyngolaryngée*


Si une oesophagoplastie est proposée : fixer le siège d'anastomose cervicale en zone saine ou cicatricielle stabilisée sur œsophage ou pharynx

- *TOGD: étendue et siège des lésions oesogastriques (sténoses)*


LA PEC DES SÉQUELLES:

TRT long et délicat
Fait appel

❖ *dilatations endoscopiques*
pour sténoses courtes et annulaires



❖ *Oesophagoplastie gastrique ou ileocolique droite*
isoperistaltique pour sténoses
longues, rigides et sinueuses
car dilatations : inefficaces et dangereuses



CONCLUSION

- *L'attitude TRT à adopter devant une brûlure caustique de l'oesophage est actuellement bien définie*
- *Cependant les résultats ne sont pas toujours satisfaisants et compte tenu de la gravité de telles lésions :*

Il est indispensable d'intensifier les mesures prophylactiques par:

- ❖ *Des campagnes d'informations auprès des consommateurs et par l'institution de règles concernant la commercialisation de tels produits*